

ご使用に際して、この説明文書を必ずお読みください。
また、必要な時に読めるよう大切に保管してください。

鼻炎用内服薬

第②類医薬品

フジビトール鼻炎薬S

製品の特徴

フジビトール鼻炎薬Sは、花粉やハウスダストなどによりひき起こされるアレルギー性鼻炎や、急性鼻炎による鼻や目、のどの不快な症状を改善する鼻炎薬です。

1回に小型のカプセル1つで効きめをあらわしますので、のみやすく、またお出かけの際の携帯にも便利な医薬品です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用・事故が起こりやすくなります。)

1. 次の人は服用しないでください

- (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (2) 次の症状のある人。
前立腺肥大による排尿困難
- (3) 次の診断を受けた人。
高血圧、心臓病、甲状腺機能障害、糖尿病

2. 本剤を服用している間は、次のいずれの医薬品も使用しないでください

他の鼻炎用内服薬、抗ヒスタミン剤を含有する内服薬等（かぜ薬、鎮咳去痰薬、乘物酔い薬、アレルギー用薬等）、胃腸鎮痛鎮痙薬

3. 服用後、乗物又は機械類の運転操作をしないでください

（眠気や目のかすみ、異常なまぶしさ等の症状があらわれることがあります。）

4. 長期連用しないでください



相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

- (1) 医師の治療を受けている人。
- (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。
- (3) 授乳中の人。
- (4) 高齢者。
- (5) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。
- (6) かぜ薬、鎮咳去痰薬、鼻炎用内服薬等により、不眠、めまい、脱力感、震え、動悸を起こしたことがある人。
- (7) 次の症状のある人。
高熱、排尿困難
- (8) 次の診断を受けた人。
緑内障、腎臓病
- (9) モノアミン酸化酵素阻害剤（セレギリン塩酸塩等）で治療を受けている人。
(セレギリン塩酸塩は、パーキンソン病の治療に用いられます。)

2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ
消化器	吐き気・嘔吐、食欲不振
精神神経系	めまい、不眠、神経過敏、頭痛、けいれん
泌尿器	排尿困難
その他	顔のほてり、異常なまぶしさ

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

症状の名称	症 状
ショック (アナフィラキシー)	服用後すぐに、皮膚のかゆみ、じんましん、声のかすれ、くしゃみ、のどのかゆみ、息苦しさ、動悸、意識の混濁等があらわれる。
急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿泡）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。
再生不良性貧血	青あざ、鼻血、歯ぐきの出血、発熱、皮膚や粘膜が青白くみえる、疲労感、動悸、息切れ、気分が悪くなりくらっとする、血尿等があらわれる。
無顆粒球症	突然の高熱、さむけ、のどの痛み等があらわれる。

3. 服用後、次の症状があらわれることがありますので、このような症状の持続又は増強が見られた場合には、服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください
□のかわき、眠気、便秘、目のかすみ
4. 5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください

効能・効果

急性鼻炎、アレルギー性鼻炎又は副鼻腔炎による次の諸症状の緩和：
くしゃみ、鼻水、鼻づまり、なみだ目、のどの痛み、頭が重い

用法・用量

1回下記量を水又はお湯と一緒に服用してください。ただし、服用間隔は4時間以上おいてください。

年齢	1回量	1日服用回数
大人（15歳以上）	1カプセル	3回
15歳未満	服用しないでください	

<用法・用量に関する注意>

- (1) 用法・用量を厳守してください。
- (2) カプセルの取り出し方
右図のようにカプセルの入っているPTPシートの凸部を指先で強く押して裏面のアルミ箔を破り、取り出して服用してください。
(誤ってそのまま飲み込んだりすると食道粘膜に突き刺さる等思わぬ事故につながります。)



成分とはたらき

成 分	分量 (3カプセル中)	はたらき
プロソイドエフェドリン塩酸塩	105mg	鼻粘膜の充血やはれをおさえて鼻づまりを改善します。
d-クロルフェニラミン マレイン酸塩	4.5mg	抗ヒスタミン作用により、くしゃみ、鼻水、鼻づまりをしずめます。
ベラドンナ総アルカロイド	0.4mg	鼻水やなみだの過剰な分泌をおさえます。
無水カフェイン	120mg	鼻炎又は副鼻腔炎による頭重感をやわらげます。
サイシン乾燥エキス (原生葉として)	30mg (300mg)	生薬のエキスで、くしゃみ、鼻水などを緩和します。

添加物として、バレイショデンプン、乳糖、セルロース、ステアリン酸Mgを含有します。カプセル本体に、ゼラチン、赤色3号、ラウリル硫酸Naを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。

●ワンポイント情報

鼻づまりや鼻水などのアレルギー症状は不快なもので、しばしば頭重感やイライラ、注意力の減退などを伴い日々の生活にも支障をきたします。

したがってアレルギー症状のやすい方は、お薬の利用とともに日常生活における自己防衛も大切になります。

掃除によりハウスダストを減らしたり、花粉の多い季節の外出時にはマスクやメガネを使用し、室内では空気清浄機を利用するなどの工夫をおすすめいたします。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時（土、日、祝日を除く）

販売元

湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

佐藤薬品工業株式会社
奈良県橿原市觀音寺町9番地の2