

肩こり・腰の痛み・筋肉痛に

新ノイガンハップホット

温かい貼りごち

特徴 新ノイガンハップホットは、4種の生薬を配合した温かい貼りごちの消炎・鎮痛パップ剤です。トウガラシエキス、ビタミンE(トコフェロール酢酸エステル)が、患部の血行を改善し、肩こりや腰痛などをやわらげます。また、消炎・鎮痛成分と3種の生薬(オウバク、サンシシ、サンショウ)のエキスが、患部のこりや痛みをしずめます。

⚠ 使用上の注意

❌ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。) 次の部位には使用しないでください。

- (1)目の周囲、粘膜等 (2)湿疹、かぶれ、傷口



相談すること

- 次の人は、使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 使用后、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この箱(又は袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、痛み

- 5~6日間使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この箱(又は袋)を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

【効能・効果】 肩こり、腰痛、筋肉痛、筋肉疲労、関節痛、打撲、捻挫、しもやけ、骨折痛

【用法・用量】 表面のプラスチックフィルムをはがし、患部に1日1~2回貼付してください。

<用法・用量に関する注意>

- 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- 打撲(うちみ)、捻挫には、はれがひいてから使用してください。
- 汗をかいたり、患部がぬれているときは、よく拭き取ってから使用してください。
- 本剤を貼った患部をコタツや電気毛布等で温めないでください。

- 本剤を貼ったまま、あるいははがした直後に入浴しないでください。(強い刺激を感じる場合がありますので、少なくとも入浴の1時間前にははがし、入浴後しばらくしてから使用してください。)
- 本剤に触れた手で、目の周囲、唇、鼻孔、その他の粘膜にさわらないでください。
- 皮膚の弱い人は、本剤を同じ所に続けて使用しないでください。(使用前に腕の内側の皮膚の弱い箇所に、1~2cm角の小片を目安として半日以上貼り、発疹・発赤、かゆみ、かぶれ等の症状が起きないことを確かめてから使用してください。)

【成分・分量】膏体100g(1,000cm²)中

サリチル酸グリコール……………2.0g d-カンフル……………0.5g
トコフェロール酢酸エステル…0.5g グリチルリチン酸……………0.03g
オウバク軟エキス……………0.7g(原生薬として2.31g)
サンシシ軟エキス……………0.33g(原生薬として1.0g)
サンショウ軟エキス……………0.3g(原生薬として1.0g)
トウガラシエキス……………0.3g(原生薬として3.75g)

添加物として、ゼラチン、カルメロースNa、D-ソルビトール、グリセリン、ポリアクリル酸Na、ポリソルベート80、尿素、エデト酸Na、カオリン、pH調整剤、その他3成分を含有します。

【保管及び取扱上の注意】

- 直射日光の当たらない涼しい所に保管してください。
- 小児の手の届かない所に保管してください。
- 他の容器に入れ替えないでください。未使用分はもとの袋に入れ、開封口のチャックをきちんとしめて外気にふれないようにしてください。
- 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

【包装】 10枚入(1枚:14cm×10cm、14g)

【販売名】 新ノイガンハップホット

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲1624
本社: 大阪市淀川区宮原4丁目5-36
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

帝國製薬株式会社

香川県東かがわ市三本松567番地

押しあける

