

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

目のかゆみ・結膜充血に

第2類医薬品

目薬

オプターナ ピュア

製品の特徴

オプターナ ピュアは、2種類の抗炎症・抗アレルギー剤配合により、かゆみ・充血などの不快な症状を改善し、さらに冷たいさしごちがスッキリ感を与える点眼薬です。



使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 ばげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ、しみて痛い

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5～6日間使用しても症状がよくなる場合

効能・効果

目のかゆみ、結膜充血、眼瞼炎(まぶたのただれ)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、目のかすみ(目やにの多いときなど)、目の疲れ、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感

用法・用量

1日3～6回、1回1～3滴点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成分	分量 (100mL中)	はたらき
イプシロン-アミノ カプロン酸	1,000mg	抗炎症・抗アレルギー作用により目の かゆみ、結膜充血、眼瞼炎などの諸症 状を改善します。
グリチルリチン酸 二カリウム	100mg	
クロルフェニラミン マレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみを おさえます。
ナファゾリン塩酸塩	3mg	血管収縮作用により目の充血を取り除 きます。
ネオスチグミン メチル硫酸塩	2mg	目の調節を支配する神経に直接作用し て、疲れ目を回復します。
ピリドキシン塩酸塩 (ビタミンB ₆)	100mg	目の代謝機能を活発にして、疲れ目な どの症状の回復を早めます。
コンドロイチン硫酸 エステルナトリウム	100mg	角膜を保護し、目の生理機能を回復し ます。

添加物として、ホウ酸、パラベン、*l*-メントール、ホウ砂、クロロブタ
ノール、チオ硫酸Na、*d*-ボルネオールを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。
(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報

近年、花粉やハウスダストなどが原因で起こる目のかゆみ、充血
などのアレルギー症状で悩んでいる人が増えています。花粉やハウ
スダストを完全にシャットアウトすることは困難ですが、外出時の
マスクやメガネの着用、毎日の掃除等の日常生活を通じて原因を寄
せつけないようにしましょう。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記まで
ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

TOA 東亜薬品株式会社

富山県富山市水橋開発277番10