この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

第2類医薬品

痔疾治療薬

レックS軟膏

製品の特徴

レックS軟膏は、患部の炎症をしずめる成分グアイアズレンとヒドロコルチゾン酢酸エステルおよび他の4種類の有効成分の配合により、痔にともなう痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれなどの症状にすぐれた効果を発揮します。青い色の有効成分グアイアズレンを配合した爽やかなスカイブルーの軟膏です。



使用上の注意



してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなります。)

- 1. 次の人は使用しないでください。
 - (1) 本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (2) 患部が化膿している人
- 2. 長期連用しないでください。



相談すること

- 1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 妊婦又は妊娠していると思われる人
 - (3) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
- 2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、 直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売 者に相談してください。

関係部位	症 状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ、はれ
その他	刺激感、化膿

3. 10日間位使用しても症状がよくならない場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

効能・効果

きれ痔(さけ痔)・いぼ痔の痛み・かゆみ・はれ・出血・ただれの緩和

用法・用量

適量をとり、肛門部に塗布してください。なお、1日3回まで使用できます。 **〈用法・用量に関する注意〉**

- (1) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (2) 肛門部にのみ使用してください。

成分とはたらき

成 分	分量 (1g中)	はたらき
グアイアズレン	0.33mg	患部の炎症をしずめます。
ヒドロコルチゾン酢酸エステル	5mg	
アルクロキサ	2.75mg	傷口の治りを早め、痔の症状をしずめます。
リドカイン	30mg	患部の痛み・かゆみをしずめます。
トコフェロール酢酸エステル	10mg	末梢の血行をよくし、患部のはれ・痛みなどの症状をしずめます。
酸化亜鉛	100mg	患部の炎症をおさえ、保護します。

添加物として、流動パラフィン、グリセリン脂肪酸エステル、無水ケイ酸、ワセリンを含有します。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。 (誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は使用しないでください。

●ワンポイント情報

痔を早く治すために

痔は、肛門周囲の血流が悪くなり、うっ血や炎症を起こす疾患です。お薬とともに、日常生活における養生が大切です。

- 1. アルコール類、タバコ、コーヒーなどの刺激物は控えま しょう。
- 2. バランスの取れた食事を心がけ、便通を整えましょう。
- 3. 散歩や体操、入浴などで血行を促しましょう。
- 4. 患部はいつも清潔にしましょう。



お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記までご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

7.

製造販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624本社:大阪市淀川区宮原4丁目5-36http://www.wakunaga.co.jp/