

この説明文書はお薬とともに保管し、ご使用の際には必ずお読みください。

眼科用薬

第2類医薬品

オプターナプレミアム

年齢・目の酷使によるつらい眼疲労 | 目やにに伴うかすみ

製品の特徴

- ◆オプターナプレミアムは、9種類の有効成分をすべて最大濃度※配合した目薬です。
- ◆ピント調節機能を改善するネオスチグミンメチル硫酸塩、目に潤いを与え、目の表面を保護するコンドロイチン硫酸エステルナトリウムのほか、栄養補給、目の新陳代謝を促進する成分でつらい眼疲労をやわらげます。
- ◆ベルベリン硫酸塩水和物とグリチルリチン酸二カリウムのふたつの生薬由来成分が炎症をしずめます。
- ◆目やにに伴うかすみ、かゆみ、充血にも効果を示すさわやかなさしごごちの黄色い目薬です。

※一般用眼科用薬製造販売承認基準の最大濃度配合

⚠ 使用上の注意



相談すること

1. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 医師の治療を受けている人
 - (2) 薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人
 - (3) 次の症状のある人 はげしい目の痛み
 - (4) 次の診断を受けた人 緑内障
2. 使用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性がありますので、直ちに使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

関係部位	症 状
皮 膚	発疹・発赤、かゆみ
目	充血、かゆみ、はれ

3. 次の場合は使用を中止し、この説明文書を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
 - (1) 目のかすみが改善されない場合
 - (2) 5~6日間使用しても症状がよくならない場合

効能・効果

目の疲れ、結膜充血、眼病予防(水泳のあと、ほこりや汗が目に入ったときなど)、紫外線その他の光線による眼炎(雪目など)、眼瞼炎(まぶたのただれ)、ハードコンタクトレンズを装着しているときの不快感、目のかゆみ、目のかすみ(目やにの多いときなど)

用法・用量

1回1~3滴、1日3~6回点眼してください。

〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 過度に使用すると、異常なまぶしさを感じたり、かえって充血を招くことがあります。
- (2) 小児に使用させる場合には、保護者の指導監督のもとに使用させてください。
- (3) 容器の先をまぶた、まつ毛に触れさせないでください。また、混濁したものは使用しないでください。
- (4) ソフトコンタクトレンズを装着したまま使用しないでください。
- (5) 点眼用にのみ使用してください。

成分とはたらき

成 分	分 量 (100mL 中)	は た ら き
塩酸テトラヒドロゾリン	50mg	血管収縮作用により、目の充血を取り除きます。
ネオスチグミンメチル硫酸塩	5mg	ピント調節機能の低下を改善し、目の疲れを改善します。
ベルベリン硫酸塩水和物	25mg	抗菌・抗炎症作用のある生薬由来成分で、炎症をしずめます。
グリチルリチン酸二カリウム	250mg	抗炎症作用のある生薬由来成分で、炎症をしずめます。
クロルフェニラミンマレイン酸塩	30mg	抗ヒスタミン作用により目のかゆみをやわらげます。
ピリドキシン塩酸塩(ビタミンB ₆)	100mg	角膜細胞の新陳代謝を促進し、目の疲れを改善します。
パンテノール	100mg	活発な新陳代謝に必要な栄養成分として働き、目の疲れを改善します。
L-アスパラギン酸マグネシウム ・カリウム(等量混合物)	2000mg	アミノ酸の一種で目に栄養を与え、目の疲れを改善します。
コンドロイチン硫酸エステル ナトリウム	500mg	目に潤いを与え、角膜を保護し、眼病を予防します。

添加物として、エデト酸Na水和物、ホウ酸、l-メントール、クロロブタノール、パラベン、ホウ砂、d-ボルネオール、塩化Naを含有します。

〈成分・分量に関する注意〉

本剤は点眼後、ときに口中に甘味を感じることがあります。これは成分のひとつであるグリチルリチン酸二カリウムが、涙道を通って口中に流れ出ることによるもので、品質などの異常によるものではありません。

保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 他の人と共用しないでください。
- (5) 使用期限(外箱に記載)を過ぎた製品は使用しないでください。また、使用期限内であっても、開封後はできるだけ速やかに使用してください。
- (6) 本剤の黄色は「ベルベリン」の色です。黄色い液が衣服などにつかないよう、十分注意してください。点眼される際には、ティッシュを目の下に当ててお使いになることをお勧めします。
- (7) 保存の状態によっては、成分の結晶が容器の先やキャップの内側につくことがあります。その場合には清潔なガーゼ等で軽くふきとつから使用してください。

環境に配慮し、携帯袋は添付しておりません。ご理解のほどお願い申し上げます。

お問い合わせ先

本剤についてのお問い合わせは、お買い求めの販売店又は下記まで
ご連絡をいただきますようお願い申し上げます。

湧永製薬株式会社 お客様相談室

☎ 0570-666-170

受付時間 9時～12時、13時～17時(土、日、祝日を除く)

販売元

湧永製薬株式会社
広島県安芸高田市甲田町下甲立1624
<http://www.wakunaga.co.jp/>

製造販売元

佐賀製薬株式会社
佐賀県三養基郡基山町小倉 481

DFW2