

4 968250 905215

吸湿しやすいため、服用のつどチャックをきちんとしめて保管してください。

チェック

販売名:フジビートルS錠<sub>w</sub> 漢方薬

第2類医薬品

## 製品の特徴

本剤は、蓄膿症や慢性鼻炎による鼻腔内の炎症、鼻汁分泌、鼻づまりといった不快な症状を改善する内服薬です。漢方処方「辛夷清肺湯」のエキスを服用しやすいフィルムコーティング錠にしました。

## 使用上の注意



## 相談すること

1. 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。(1) 医師の治療を受けている人。(2) 妊婦又は妊娠していると思われる人。(3) 体の虚弱な人(体力の衰えている人、体の弱い人)。(4) 胃腸虚弱で冷え症の人。
2. 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

| 関係部位 | 症 状        |
|------|------------|
| 消化器  | 食欲不振、胃部不快感 |

まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けてください。

| 症状の名称    | 症 状                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 間質性肺炎    | 階段を上ったり、少し無理をしたりすると息切れがする・息苦しくなる、空せき、発熱等がみられ、これらが急にあらわれたり、持続したりする。 |
| 肝機能障害    | 発熱、かゆみ、発疹、黄疸(皮膚や白目が黄色くなる)、褐色尿、全身のだるさ、食欲不振等があらわれる。                  |
| 腸間膜静脈硬化症 | 長期服用により、腹痛、下痢、便秘、腹部膨満等が繰り返しあらわれる。                                  |

3. 1ヵ月位服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この袋を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。
4. 長期連用する場合には、医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。

## 効能・効果

体力中等度以上で、濃い鼻汁が出て、ときに熱感を伴うものの次の諸症:鼻づまり、慢性鼻炎、蓄膿症(副鼻腔炎)

販売元

湧永製薬株式会社

広島県安芸高田市甲田町下甲立1624  
http://www.wakunaga.co.jp/

製造販売元

中村薬品工業株式会社

奈良県高市郡高取町大字丹生谷31,32番地



## 用法・用量

1回下記量を食前又は食間に水又は白湯と一緒に服用してください。

| 年齢        | 1回量        | 1日服用回数 |
|-----------|------------|--------|
| 大人(15歳以上) | 4錠         | 2回     |
| 7歳以上15歳未満 | 3錠         |        |
| 5歳以上 7歳未満 | 2錠         |        |
| 5歳未満      | 服用しないでください |        |

食間とは、「食事と食事の間」という意味です。食事のあと2時間ぐらいたったところで服用してください。

## 〈用法・用量に関する注意〉

- (1) 定められた用法・用量を厳守してください。
- (2) 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させてください。

## 成分・分量 (8錠中)

|          |         |        |       |
|----------|---------|--------|-------|
| 辛夷清肺湯エキス | 2,500mg |        |       |
| シンイ      | 1.0 g   | バクモンドウ | 2.5 g |
| チモ       | 1.5 g   | セッコウ   | 2.5 g |
| ビャクゴウ    | 1.5 g   | ショウマ   | 0.5 g |
| オウゴン     | 1.5 g   | ビフヨウ   | 1.0 g |
| サンシシ     | 1.5 g   |        | より抽出  |

添加物として、二酸化ケイ素、クロスカルメロースNa、ステアリン酸Mg、セルロース、ヒプロメロース、マクロゴール、カルナウパロウを含有します。

## 保管及び取扱い上の注意

- (1) 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管してください。
- (2) 小児の手の届かない所に保管してください。
- (3) 他の容器に入れ替えないでください。(誤用の原因になったり品質が変わります。)
- (4) 使用期限を過ぎた製品は服用しないでください。
- (5) 服用のつどチャックを押さえてみてください。
- (6) 本剤は、生薬を用いた製剤ですので、製品により色が多少異なることがあります。効果に変わりはありません。
- (7) 錠剤をぬれた手で扱わないでください。
- (8) ぬれた錠剤は袋に戻さないでください。

お問い合わせ先 湧永製薬(株) お客様相談室

☎0570-666-170

受付時間 9時~12時、13時~17時(土、日、祝日を除く)

副作用被害救済制度 ☎0120-149-931

使用  
期限製造  
番号

DAXFB

A